

PL

ENDO-PREP gel

Żel do opracowywania kanałów korzeniowych
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNĄĆ SIE Z PONIŻSZA INSTRUKCJĄ
 WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD: wersenian disodowy (EDTA 17%), baza żelowa.

PRZENACZENIE

Preparat ENDO-PREP GEL stosuje się do chemiczno-mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych. Zawarty w preparacie EDTA wspomaga usuwanie soli wapnia ze zwapionych kanałów oraz miazgi, pozwalając na szybsze oczyszczenie i ukształtowanie kanałów. Substancje pośródnowe zawarte w wyrobie ułatwiają wprowadzenie narzędzi do kanału i minimalizują możliwość złamania narzędzią w kanale.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do zabiegu należy załączony aplikator zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy), a następnie umieścić na strzykawce. Po otwarciu komory zęba przepłukać ją podchlorynem sodu. Wypełnić komórę zęba preparatem przy pomocy załączonego aplikatora lub umieścić preparat bezpośrednio na narzędziu kanałowym. Opracowywać kanał mechanicznie przepukując roztworem podchlorynu sodu. Wyrob przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednorazowego. Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu. Nie pozostawiać preparatu w kanale ani w komorze zęba pomiędzy wizytami. Może do doprowadzić do nadmiernego zmękczenia zębiny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy zachować szczególną ostrożność podczas opracowywania kanału w okolicy otworu anatomicznego, gdyż może dojść do perforacji korzenia poprzez narzędzia kanałowe. Działają drażniąco na skórę i oczy. W razie kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

W razie spożycia nie zmuszać do wymiotów. Wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.

Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam. Stosować rękawiczki, okulary ochronne i odzież ochronną.

PRZEOCHOWYWARIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamknięcia po każdorazowym użyciu.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub wrócić do wytwórcy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Strzykawka zawierająca 2 ml, 5 ml lub 10 ml preparatu, aplikatory jednorazowe.

PL

Zel do opracowywania kanałów korzeniowych

RU

Гель для обработки корневых каналов

EN

Gel for root canals preparation

ES

Gel para el tratamiento de los canales radiculares

FR

Gel pour la préparation des canaux radiculaires

DE

Gel zur Präparation von Wurzelkanälen

Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2017/5

ENDO-PREP gel



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
 37-450 Stalowa Wola, Poland
 ul. Kwiatkowskiego 1
 Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com

CE 2409

Data ostatniej aktualizacji: 08.06.2017/5

EN

ENDO-PREP gel

Gel for root canals preparation

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
 PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

COMPOSITION: disodium edetate (EDTA 17%), gel base.

INTENDED USE

Product ENDO-PREP GEL is intended for chemo-mechanical root canal preparation. EDTA contained in the product helps to remove calcium salts and pulp from decalcified root canals, enabling for faster cleansing and shaping the canals. Thanks to the lubricant substances contained in the product, it is much easier to work with the root canal instruments and the risk of breakage of the instrument in the root canal is minimized.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before the treatment immerse attached applicator into ethyl alcohol and then place it onto the syringe. Open the tooth cavity and rinse it with sodium hypochlorite. Insert the preparation into tooth cavity by means of attached applicator or place it directly on the root canal instrument. Prepare the canal mechanically while rinsing it with sodium hypochlorite simultaneously. Product intended for multiple use except the applicator which is for single use only. Multiple use of applicator may cause the risk of reinfection.

CONTRAINDICATIONS

Do not use ENDO PREP GEL for patients with hypersensitivity to the product's components. Do not leave ENDO PREP GEL in the canal or in the tooth cavity between the visits. It may soften the dentin too much.

PRECAUTIONS

Caution should be taken during canal preparation close to the apex area, because it may cause perforation of the canal as a result of use of root canal instruments. Eye and skin irritant. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek for medical advice. In case of consumption drink copious amount of water. Do not extract emesis. Seek for medical advice. Necessary use of rubber-dam while working with the product. Use gloves, protective glasses and clothing.

STORAGE

Store in original packaging at temperature below 25 °C. Store out of reach of children. Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry date doesn't change if it is securely closed after each use.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER

Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

PACKAGING

Syringe of 2 ml, 5 ml or 10 ml of preparation, disposable applicators.



25°C



25°C

Last update: 08.06.2017/5

ES

ENDO-PREP gel

Gel para el tratamiento de los canales radiculares

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROcede LEER LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
 EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO UNICAMENTE POR ODONTOLOGOS PROFESIONALES

COMPOSICIÓN: versenato disódico (EDTA 17%), base de gel.

FINALIDAD

La preparación ENDO-PREP GEL se emplea para el tratamiento químico-mecánico de los canales radiculares. El EDTA contenido en el producto facilita la eliminación de sales de calcio de los canales calcificados y de la pulpa dentaria, favoreciendo una limpieza y conformatión más rápida de los canales. Las sustancias lubricantes contenidas en el producto facilitan la introducción del instrumento en el canal y minimizan la posibilidad de romper el instrumento una vez colocado en el canal.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de comenzar el tratamiento sumergir el aplicador incluido en el suministro en alcohol (alcohol etílico) y luego introducirlo en la jeringa.

Tras abrir la cavidad pulpar enjuagarla con hipoclorito de sodio. Rellenar la cavidad pulpar con el producto empleando el aplicador incluido, o bien, colocar el producto directamente sobre el instrumento para los canales radiculares. Realizar el tratamiento mecánico del canal enjuagándolo con una solución de hipoclorito de sodio. Lavar bien el producto de los canales y de la cavidad pulpar empleando la solución de hipoclorito de sodio.

El producto es reutilizable, pero el aplicador es desecharable. La reutilización del aplicador puede provocar el riesgo de infecciones secundarias.

CONTRAINDICACIONES

No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los ingredientes del producto.

No dejar el producto en el canal ni en la cavidad pulpar entre las consultas. Esto puede provocar un ablandamiento excesivo de la dentina.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Prestar una atención especial a la hora de tratar el canal en el área del foramen anatómico, ya que puede producirse la perforación de la raíz por medio de los instrumentos aplicados al canal. Irrita la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuagar los ojos con grandes cantidades de agua y procurar atención médica.

En caso de consumo no inducir vómitos. Beber grandes cantidades de agua. Procurar atención médica.

Emplear un diente dental a la hora de trabajar con el producto. Emplear guantes, gafas y ropa de protección.

ALMACENAMIENTO

Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25 °C.

Guardar fuera del alcance de los niños.

La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

MANIPULACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO

Residuos de embalajes deben entregarse a la eliminación o devolverse al fabricante.

EMBALAJES

Jeringa con 2 ml, 5 ml o 10 ml del producto, aplicadores desechables.



25°C



25°C

Fecha de la última revisión: 08.06.2017/5

FR

ENDO-PREP gel

Gel pour la préparation des canaux radiculaires

MERCY DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT UTILISATION
 PRODUIT POUR USAGE DENTAIRE UNIQUEMENT

COMPOSITION: acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA 17%), base de gel.

UTILISATION

Le produit ENDO-PREP GEL est destiné à la préparation chéo-mécanique du canal radiculaire. L'EDTA contenu dans ce produit contribue à éliminer les sels de calcium et les débris organiques des canaux radiculaires, permettant ainsi la mise en forme et le nettoyage rapide des racines.

Grâce aux substances lubrifiantes contenues dans le produit, il est beaucoup plus facile de travailler avec des instruments rotatifs et le risque de rupture de l'outil dans le canal radiculaire est minimisé.

INSTRUCTIONS DE USO

Antes de comenzar el tratamiento sumergir el aplicador incluido en la jeringa.

Tras abrir la cavidad pulpar enjuagarla con hipoclorito de sodio. Rellenar la cavidad pulpar con el producto empleando el aplicador incluido, o bien, colocar el producto directamente sobre el instrumento para los canales radiculares. Realizar el tratamiento mecánico del canal enjuagándolo con una solución de hipoclorito de sodio.

El producto es reutilizable, pero el aplicador es desecharable. La reutilización del aplicador puede provocar el riesgo de infecciones secundarias.

MODE D'EMPLOI

Avant le traitement désinfecter l'applicateur avec de l'alcool éthylique et puis placez-le sur la seringue. Ouvrez la cavité de la dent et la rincez avec de l'hypochlorite de sodium. Insérez la préparation dans la cavité de la dent à l'aide de l'applicateur-joint ou la placer directement sur l'instrument endodontique.

Préparer le canal mécaniquement tout en le rinçant avec de l'hypochlorite de sodium simultanément.

Produit destiné à un usage multiple, sauf l'applicateur qui est à usage unique. L'utilisation multiple de l'applicateur peut causer un risque de réinfection.

CONTRÉ-INDICATIONS

Ne pas utiliser ENDO PREP Gel chez les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

Ne pas laissez ENDO PREP Gel dans le canal ou dans la cavité de la dent en interseance. Il peut ramollir la dentine de façon trop importante.

PRÉCAUTIONS

La prudence doit être de mise au cours de la préparation du canal dans la zone de l'apex, car il y a risque de perforation du canal avec l'instrument.

Le produit provoque l'irritation. En cas de contact rincer abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin si l'irritation ne cesse pas.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et consulter un médecin.

L'utilisation d'une digue dentaire est recommandée lors de l'utilisation du produit. Utilisez des gants, des lunettes et des vêtements de protection.

STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine à une température de 25 °C.

Conserver hors de la portée des enfants. La date de péremption est placée sur le conteneur principal. Une fois le conteneur ouvert, la date d'expiration ne change pas si il est bien fermé après chaque utilisation.

ELIMINATION DES CONTENEURS

Les récipients vides doivent être éliminés de façon responsable ou retournés au fabricant.

CONDITIONNEMENT

Seringue de 2 ml, 5 ml ou 10 ml de préparation, applicateurs jetables.



25°C



25°C

Date de dernière mise à jour: 08.06.2017/5

DE

ENDO-PREP gel

Гель для обработки корневых каналов

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИВЕДЕНОЙ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЕЙ
ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ: динатрия эдатат (ЭДТА 17%), гелевая основа.

НАЗНАЧЕНИЕ

Препарат ENDO-PREP GEL применяется для химико-механической обработки корневых каналов. Содержащаяся в препарате ЭДТА способствует устранению солей кальция из кальцинированных каналов и пульпы, создавая возможность быстрой очистки и формирования каналов. Смазочные вещества, содержащиеся в препарате, облегчают введение инструмента в канал и минимизируют возможность излома инструмента в канале.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом процедуры прилагаемый аппликатор следует обязательно промокнуть в спирте (этиловый спирт), а затем установить на шприце. После открытия полости зуба, промыть ее гипохлоритом натрия. Заполнить полость зуба препаратором при помощи прилагаемого аппликатора или поместить препарат непосредственно на канальный инструмент. Выполнить механическую обработку канала, промывая раствором гипохлорита натрия. Чистотным образом вымыть препарат из каналов и полости зуба с помощью гипохлорита натрия. Препарат предназначен для многократного использования, в то время как аппликатор предназначен для однократного использования. Многократное использование аппликатора может создавать опасность вторичной инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата. Не оставляйте препарат в канале и в полости зуба до следующего приема у врача. Это может привести к чрезмерному размягчению dentina.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следует соблюдать особую осторожность при обработке канала в районе анатомического отверстия, так как это может привести к перфорации корня инструментом для корневых каналов. Препарат оказывает раздражающее воздействие на глаза и кожу. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае употребления не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Связаться с врачом. При работе с продуктом использовать коффердам. Использовать перчатки, защитные очки и защитную одежду. В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности указан на первичной упаковке. После вскрытия упаковки срок годности не изменяется, при условии плотного закрытия после каждого использования.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ИЗДЕЛИЯ

Использованные упаковки следует передать для утилизации или вернуть производителю.

УПАКОВКА

Шприц, содержащий 2 мл, 5 мл или 10 мл препарата, одноразовые аппликаторы.



ENDO-PREP gel

Gel per la lavorazione del canale radicolare

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE:

diossido edetato (EDTA 17%), a base di gel.

APPLICAZIONE

Il preparato ENDO-PREP GEL serve per la lavorazione chimico-mecanica dei canali radicolari. L'EDTA presente nel preparato aiuta l'eliminazione del sale di calcio dai canali calcificati e dalla polpa, permettendo la pulizia e la formazione più rapida dei canali. Le sostanze lubrificanti presenti nel preparato facilitano l'introduzione dello strumento nel canale minimizzando la possibilità di rottura dello strumento nel canale.

MODALITÀ D'USO

Prima di iniziare il trattamento, immergere l'applicatore acceso nell'alcool (alcool etilico) e successivamente posizionarlo sulla siringa. Dopo l'apertura della cavità del dente, sciacquare con ipoclorito di sodio. Riempire la cavità del dente con il preparato usando l'applicatore in dotazione o mettere il preparato direttamente sullo strumento canolare. Lavorare meccanicamente il canale, risciacquandolo con ipoclorito di sodio. Togliere accuratamente il preparato dai canali e dalla cavità del dente usando la soluzione con ipoclorito di sodio. Il prodotto può essere usato più volte, invece l'applicatore è monouso. L'uso multiplo dell'applicatore può comportare il rischio di infezione retrograda.

CONTRAINDICAZIONI

Non utilizzare il prodotto nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato. Non lasciare il preparato nel canale né nella cavità del dente tra una visita e l'altra. Ciò può causare l'ammorbidente eccessivo della dentina.

PRECAUZIONI

Bisogna prestare molta attenzione durante la lavorazione del canale nelle vicinanze del foro anatomico perché c'è il rischio di perforazione della radice dallo strumento canolare. Irrita gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare con molta acqua e contattare un medico. In caso di inghiottimento, non provocare il vomito. Bere molta acqua. Contattare un medico. Durante il lavoro usare il dental dam. Indossare i guanti, gli occhiali di protezione e gli indumenti di protezione.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura inferiore ai 25 °C. Conservare lontano dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova sulla confezione diretta. Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE

Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Siringa contenente 2 ml, 5 ml o 10 ml di preparato, applicatori monouso.



ENDO-PREP gel

Preparat pentru lărgirea canalelor radiculare

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGAM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INSTRUCTIUNI
PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR

COMPOZIȚIE:

edetat disodic (EDTA 17%), gel.

APLICARE

Preparatul ENDO-PREP GEL servește pentru tratarea chimico-mecanică a canalilor radiculare. EDTA prezent în preparat ajută la eliminarea sălilor de calciu din canalii calcificați și din pulpa, creând astfel posibilitatea de a obține curățenie și formare mai rapidă a canalului. Substanțele lubrificante prezente în preparat favorizează introducerea instrumentului în canalul radicular.

MODALITĂ D'UZO

Pentru a iniția tratarea, sărgați aplicatorul în alcool (alcool etilic) și împingeți-l pe suport. Deschideți cavitatea dentului cu apă și scărați-o cu ipocloritul de sodiu. Încărcați aplicatorul cu preparatul și împingeți-l în canalul radicular. Înlocuiți apă cu soluția de ipoclorit de sodiu. Îndepărtați aplicatorul după utilizare, folosind apă și ipoclorit de sodiu. Utilizați apă și ipoclorit de sodiu pentru a dilua preparatul și a înlătura resturile de apă din canal.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Atașați aplicatorul la siringă, dar nu înainta de a îl introduce în alcool etilic. Închideți cavitatea dentului cu ipoclorit. Umpleți canalul cu preparat sau aplicatorul direct pe instrumentul rotativ.

Preparați mecanic canalul cu finalizarea prin clătirea cu soluție de ipoclorit de sodiu. Îndepărtați aplicatorul și deschideți orificiile spre canalele laterale. Datorită compozitiei, este posibil să se deschidă orificii în canalul radicular.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați ENDO-PREP gel pentru pacienții cu hipersensibilitate la componentele acestuia. Nu lăsați ENDO-PREP gel în canal sau în cavitatea dintelui între vizite; poate înmura dentina prea mult.

PRECAUȚII

Bisognă prestație multă atenție durata de la realizarea canalului deoarece poate provoca perforarea canalului radicular ca urmare a utilizării instrumentului rotativ.

Are acțiune iritantă asupra pielii și a ochilor. În caz de contact cu o cantitate mare de apă.

Cereti sfatul medicalului în cazul în care iritația nu dispără.

Este necesară utilizarea foliei de digă în timp ce lucrează cu produsul.

Este necesară folosirea manusiilor și a ochelor de protecție în timp ce se lucrează cu produsul.

ATENȚIE

Trebuiți să luăți măsuri de precauție înainte de prepararea canalului deoarece poate provoca perforarea canalului radicular ca urmare a utilizării instrumentului rotativ.

Are acțiune iritantă asupra pielii și a ochilor. În caz de contact cu o cantitate mare de apă.

Cereti sfatul medicalului în cazul în care iritația nu dispără.

Este necesară utilizarea foliei de digă în timp ce lucrează cu produsul.

DEPOZITARE

Conservare în confezione originală ad una temperatura inferiore ai 25 °C.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

La data di scadenza si trova sulla confezione diretta. Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

MANIPULARE

Recipientele goale trebuie aruncate în mod responsabil sau returnate producătorului.

AMBALAJUL

Siringă de 2 ml, 5 ml sau 10 ml, aplicatoare de unică folosință.

ENDO-PREP gel

Gyökérkatszorna tágító gél

HASZNÁLAT ELŐTT ÖVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
KIZÁRÓLAG FOGÁZATI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

ÖSSZETÉTEL: 17% EDTA (Ethylenediamin-Tetracetic Acid), gél alapban

INDIKÁCIÓK

Az ENDO-PREP GEL termékek a gyökérkatszorna kémiai-mechanikai tiszítására során használhatók.

Preparatul contine EDTA, care înmoiește sălurile de calciu din canalul radicular, și ajută la curățarea și formarea mai rapidă a canalului. Síkositott tulajdonsága révén megkönyíti a gyökérkatszorna belső falát. Ez az egyszerűbb és gyorsabb a gyökérkatszorna tágítással.

Használati utasítás

Az ENDO-PREP GEL termékek a gyökérkatszorna kémiai-mechanikai tiszítására során használhatók.

Preparatul contine EDTA, care înmoiește sălurile de calciu din canalul radicular, și ajută la curățarea și formarea mai rapidă a canalului. Síkositott tulajdonsága révén megkönyíti a gyökérkatszorna belső falát. Ez az egyszerűbb és gyorsabb a gyökérkatszorna tágítással.

Kontrolált alkalmazás

Az ENDO-PREP GEL termékek a gyökérkatszorna kémiai-mechanikai tiszítására során használhatók.

Preparatul contine EDTA, care înmoiește sălurile de calciu din canalul radicular, și ajută la curățarea și formarea mai rapidă a canalului. Síkositott tulajdonsága révén megkönyíti a gyökérkatszorna belső falát. Ez az egyszerűbb és gyorsabb a gyökérkatszorna tágítással.

Használati előírás

Az ENDO-PREP GEL termékek a gyökérkatszorna kémiai-mechanikai tiszítására során használhatók.

Preparatul contine EDTA, care înmoiește sălurile de calciu din canalul radicular, și ajută la curățarea și formarea mai rapidă a canalului. Síkositott tulajdonsága révén megkönyíti a gyökérkatszorna belső falát. Ez az egyszerűbb és gyorsabb a gyökérkatszorna tágítással.

Használati előírás

Az ENDO-PREP GEL termékek a gyökérkatszorna kémiai-mechanikai tiszítására során használhatók.

Preparatul contine EDTA, care înmoiește sălurile de calciu din canalul radicular, și ajută la curățarea și formarea mai rapidă a canalului. Síkositott tulajdonsága révén megkönyíti a gyökérkatszorna belső falát. Ez az egyszerűbb és gyorsabb a gyökérkatszorna tágítással.

Használati előírás

Az ENDO-PREP GEL termékek a gyökérkatszorna kémiai-mechanikai tiszítására során használhatók.

Preparatul contine EDTA, care înmoiește sălurile de calciu din canalul radicular, și ajută la curățarea și formarea mai rapidă a canalului. Síkositott tulajdonsága révén megkönyíti a gyökérkatszorna belső falát. Ez az egyszerűbb és gyorsabb a gyökérkatszorna tágítással.

Használati előírás

Az ENDO-PREP GEL termékek a gyökérkatszorna kémiai-mechanikai tiszítására során használhatók.

Preparatul contine EDTA, care înmoiește sălurile de calciu din canalul radicular, și ajută la curățarea și formarea mai rapidă a canalului. Síkositott tulajdonsága révén megkönyíti a gyökérkatszorna belső falát. Ez az egyszerűbb és gyorsabb a gyökérkatszorna tágítással.

Használati előírás

Az ENDO-PREP GEL termékek a gyökérkatszorna kémiai-mechanikai tiszítására során használhatók.

Preparatul contine EDTA, care înmoiește sălurile de calciu din canalul radicular, și ajută la curățarea și formarea mai rapidă a canalului. Sík