

PL

# GLUCOSITE

Płyn do kieszonek dziąsłowych

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA****SKŁAD:** woda, alkohol etylowy, diglukonian chlorheksydyny, nadtlenek wodoru**PRZEZNACZENIE**

Wyrób GLUCOSITE przeznaczony jest do stosowania podczas zabiegów stomatologicznych, prowadzonych przez lekarza, do przepłukiwania kieszonek dziąsłowych i innych, trudno dostępnych obszarów błony śluzowej jamy ustnej w celu ich przemywania i oczyszczania.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Przed przystąpieniem do zabiegu dołączony aplikator zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy), a następnie umieścić na strzykawce. Za pomocą dołączonego aplikatora umieścić płyn w kieszonce dziąsłowej, wprowadzić preparat do kieszonki przesuując aplikator wzdluz linii dziąsła. Po zakończonej aplikacji przepłukać jamę ustną czystą wodą.

W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po ok 7 dniach.

**PRZECIWWSKAZANIA**

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na składniki preparatu.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

W razie kontaktu z oczami natychmiast splukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

W razie spożycia skontaktować się z lekarzem.

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

**POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAM I PO WYROBIE**

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

**DOSTĘPNE OPAKOWANIA**

Strzykawka zawierająca 2 ml wyrobu, aplikatory jednorazowe. Butelka zawierająca 50 ml wyrobu, adapter z zakrętką, dozownik, aplikatory jednorazowe.



Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2020/2

EN

# GLUCOSITE

Liquid for gingival pockets

**BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY**  
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY**INGREDIENTS:** water, ethyl alcohol, chlorhexidine digluconate, hydrogen peroxide**INTENDED USE**

GLUCOSITE is intended for use during dental procedures carried out by a doctor, for irrigating gingival pockets and other difficult to reach areas of the oral mucosa to wash and cleanse.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

Put the supplied applicator in ethanol before use, then install the applicator on the syringe. Using the included applicator, insert the liquid in the gingival pocket and continue moving the applicator along the gum line. When the application is finished, rinse the mouth with clean water. If necessary, repeat the treatment after about 7 days.

**CONTRAINDICATIONS**

Do not use the product for patients with hypersensitivity to the product's components.

**PRECAUTIONS**

In case of contact with eyes, rinse immediately with copious amount of water and seek medical advice.

In case of consumption seek medical advice.

**STORAGE**

Store in original packaging below 25 °C. Keep out of reach of children. Expiry date is placed on the main container.

Once the container is open, the expiry date doesn't change if it the container is securely closed after each use.

**HANDLING THE PRODUCT CONTAINER**

Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

**PACKAGING**

Syringe containing 2 ml of the product, disposable applicators. Bottle containing 50 ml of product, adapter with screw cap, dispenser, disposable applicators.



Last update: 13.03.2020/2

ES

# GLUCOSITE

Líquido para bolsas periodontales

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES**  
EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES**COMPOSICIÓN:** agua, alcohol etílico, digluconato de clorhexidina, peróxido de hidrógeno**USO**

El producto GLUCOSITE se utiliza durante tratamientos dentales realizados por un médico, para irrigar bolsas periodontales y otras áreas de la mucosa bucal de difícil acceso para enjuagar y limpiarlas.

**INSTRUCCIONES DE USO**

Antes de empezar el tratamiento, sumergir el aplicador adjunto en el alcohol (alcohol etílico) y luego colocarlo en la jeringa. Insertar el líquido con el aplicador incluido en la bolsa moviendo el aplicador a lo largo de la línea de la encía. Después de la aplicación, enjuagar la boca con agua limpia. Si es necesario, el tratamiento puede repetirse después de aprox. 7 días.

**CONTRAINDICACIONES**

No usar en personas con hipersensibilidad a los componentes del producto.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con grandes cantidades de agua y consultar a un médico.

En caso de ingestión consultar a un médico.

**ALMACENAMIENTO**

Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25° C. Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto.

Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

**MANIPULACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO**

Los residuos de embalajes deben entregarse para la eliminación o devolverse al fabricante.

**ENVASES DISPONIBLES**

Jeringa con 2 ml del producto, aplicadores desechables. Botella con 50 ml del producto, adaptador con tapón de rosca, dispensador, aplicadores desechables.



Fecha de la última revisión: 13.03.2020/2

FR

# GLUCOSITE

Liquide parodontal

**LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION**  
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE**COMPOSITION:** eau, alcool éthylique, digluconate de chlorhexidine, peroxyde d'hydrogène**UTILISATION PREVUE**

Le produit GLUCOSITE est destiné à être utilisé durant des soins dentaires effectués par un médecin pour rincer les poches parodontales et d'autres zones de mucus de la cavité buccale difficilement accessibles, pour les rincer et nettoyer.

**MODE D'EMPLOI**

Avant de procéder à l'intervention, tremper l'applicateur dans de l'alcool éthylique, puis l'installer sur la seringue. A l'aide de l'applicateur fourni appliquer du liquide dans la poche parodontale, introduire le produit dans la poche, en déplaçant l'applicateur le long de la ligne de la gencive. Après l'application, rincer la cavité buccale avec de l'eau claire. Si besoin, l'opération peut être répétée au bout d'environ 7 jours.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez des patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

**PRECAUTIONS**

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau immédiatement et contacter un médecin.

En cas d'ingestion, contacter un médecin.

**CONSERVATION**

Conservier le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25 °C.

Tenir hors de portée des enfants. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'emballage direct.

Après ouverture, la date de péremption ne change pas, à condition de refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.

**RECYCLAGE DES EMBALLAGES**

Les emballages usagés doivent être remis pour recyclage ou retournés au fabricant.

**CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES**

Seringue contenant 2 ml de produit, applicateurs à usage unique. Bouteille contenant 50 ml de produit, adaptateur avec bouchon, applicateurs à usage unique.



Date de dernière mise à jour: 13.03.2020/2

DE

# GLUCOSITE

Fluid für Zahnfleischtaschen

**BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRÜNDLICH DIE PACKUNGSBEILAGE**  
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT**INHALTSSTOFFE:** Wasser, Ethylalkohol, Chlorhexidin-Digluconat, Wasserstoffperoxid**VERWENDUNGSZWECK**

Das Mittel GLUCOSITE ist zur Verwendung vom Zahnarzt während der stomatologischen Behandlung (Spülung, Reinigung, Auswaschen) der Zahnfleischtaschen und anderen, schwer erreichbaren Schleimhaut- und Mundhöhlebereichen bestimmt.

**GEBRAUCH**

Vor Anwendung den beigefügten Applikator in Alkohol eintauchen (Ethylalkohol) und nachfolgend auf die Spritze setzen. Mit Hilfe des beigefügten Applikators führen Sie das Fluid in die Zahnfleischtasche ein, indem Sie das Mittel in die Zahnfleischtasche entlang der Zahnfleischlinie hineinpresse. Nach dem Ende der Behandlung spülen Sie die Mundhöhle mit reinem Wasser. Wenn es nötig ist, kann man die Behandlung nach etwa 7 Tagen wiederholen.

**GEGENANZEIGEN**

Nicht bei Patienten mit etwaiger Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Präparats anwenden.

**SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

Bei Kontakt mit Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Nach Verschlucken einen Arzt konsultieren.

**AUFBEWAHRUNG**

In Originalverpackung bei Temperaturen unter 25° C lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten Verpackung angegeben. Das Haltbarkeitsdatum ändert sich nach dem Öffnen nicht, sofern die Packung nach Gebrauch wieder fest verschlossen wird.

**ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG**

Verbrauchte Packungen sind sachgerecht zu entsorgen oder an den Hersteller zurückzusenden.

**VERPACKUNG**

Spritze von 2 ml des Produkts, Einwegapplikatoren. Flasche von 50 ml des Produkts, Adapter mit Mutter, Spender, Einwegapplikatoren.



Letzte Aktualisierung: 13.03.2020/2

UK

# GLUCOSITE

Рідина для пародонтальних кишень

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ**  
ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЕМ СТОМАТОЛОГОМ**СКЛАД:** вода, етиловий спирт, хлоргексидин диглюконат, гідроген пероксид**ПРИЗНАЧЕННЯ**

Препарат GLUCOSITE призначений для використання під час стоматологічних процедур, які проводяться лікарем стоматологом, для промивання та очищення ясенних кишень та інших важкодоступних ділянок слизової оболонки порожнини рота.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ**

Перш ніж розпочати процедуру, слід занурити в етиловий спирт і накласти на шприц аплікатор, що додається. За допомогою аплікатора, що додається, ввести рідину для пародонтальної кишені, пересуваючи аплікатор уздовж лінії ясен. Після завершення процедури промити роту порожнину чистою водою. При необхідності процедуру можна повторити приблизно через 7 днів.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ**

Підвищена чутливість до одного зі складників препарату.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

При потрапленні препарату в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. У разі проковтування звернутися за порадою до лікаря.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності вказаний на первинній (внутрішній) упаковці. Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

**ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ УПАКОВКИ**

Відходи упаковки слід передавати на підприємство з утилізації або повернути виробнику.

**УПАКОВКА**

Шприц, що містить 2 мл препарату, одноразові аплікатори. Пляшечка, що містить 50 мл препарату, адаптер з кришкою, дозатор, одноразові аплікатори.



Дата останнього оновлення: 13.03.2020/2

PL

Płyn do kieszonek dziąsłowych

CS

Kapalina k výplachu dásňových žlábků

EN

Liquid for gingival pockets

RU

Жидкость для десневых карманов

ES

Líquido para bolsas periodontales

IT

Liquido per tasche parodontali

FR

Liquide parodontal

RO

Lichid pentru pungii gingivale

DE

Fluid für Zahnfleischtaschen

HU

Folyadék inyasakok kezeléséhez

UK

Рідина для пародонтальних кишень

BG

Течност за венечни джобове

LT

Dantėnų kišenių skystis

Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2020/2

# GLUCOSITE



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Poland  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel./fax: + 48 15 842 35 85  
www.cerkamed.com



Kapalina k výplachu dásňových zlábků

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD**  
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

**SLOŽENÍ:** voda, ethanol, chlorhexidin dihydrochlorid, peroxid vodíku

#### URČENÍ

Výrobek GLUCOSITE je určen k používání během stomatologických zákroků prováděných lékařem, k proplachování dásňových zlábků a jiných, špatně dostupných oblastí sliznice ústní dutiny za účelem jejich omývání a čištění.

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

Příložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do líhu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku. Pomocí příloženého aplikátoru naneste kapalinu do dásňového zlábků, posouváním aplikátoru podél linie dásní aplikujte přípravek do zlábků. Po aplikaci vypláchněte ústa čistou vodou. V případě potřeby zopakujte zákrok po 7 dnech.

#### KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

#### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

V případě zasažení očí okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc.

#### SKLADOVÁNÍ

Składujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Składujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah balení po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

#### NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

#### DOSTUPNÉ OBALY

Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, jednorázové aplikátory. Lahvička s obsahem 50 ml přípravku, adaptéř se šroubovacím uzávěrem, dávkovače, jednorázové aplikátory.



Жидкость для десневых карманов

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ**  
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

**СОСТАВ:** вода, этиловый спирт, биглюконат хлоргексидина, перекись водорода

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Препарат GLUCOSITE предназначен для использования во время проводимых врачом стоматологических процедур, для прополаскивания десневых карманов и других труднодоступных мест слизистой оболочки полости рта с целью их промывания и очищения.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Прежде чем приступить к процедуре, прилагаемый аппликатор следует погрузить в этиловый спирт, затем установить его на шприце. Используя прилагаемый аппликатор, поместить жидкость в десневой карман; препарат вводится в карман при перемещении аппликатора вдоль линии десен. После применения жидкости прополоскать рот чистой водой.

При необходимости процедуру можно повторить примерно через 7 дней.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять на пациентах с повышенной чувствительностью к ингредиентам препарата.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

В случае проглатывания обратиться к врачу.

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности указан непосредственно на сборной емкости.

После вскрытия емкости срок годности не изменяется при условии плотного ее закрытия после каждого использования.

#### ОБРАЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ЕМКОСТЯМИ

Использованные емкости должны быть утилизированы или возвращены изготовителю.

#### ИМЕЮЩИЕСЯ ЕМКОСТИ

Шприц, содержащий 2 мл препарата, одноразовые аппликаторы. Флакон, содержащий 50 мл препарата, адаптер с винтовой крышкой, дозатор, одноразовые аппликаторы.



Liquido per tasche paradontali

**PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE**  
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

**COMPOSIZIONE:** acqua, alcool etilico, digluconato di clorexidina, perossido di idrogeno

#### APPLICAZIONE

GLUCOSITE è destinato alle cure odontoiatriche, condotte da un medico, per il risciacquo delle tasche paradontali e per il lavaggio e la pulizia di altre aree difficili da raggiungere della mucosa orale.

#### MODALITÀ D'USO

Prima di iniziare il trattamento, immergere l'applicatore in dotazione nell'alcool (alcool etilico) e successivamente posizionarlo sulla siringa. Utilizzando l'applicatore in dotazione, posizionare il liquido nella tasca paradontale e introdurre il prodotto nella tasca spostando l'applicatore lungo la linea gengivale. Al termine dell'applicazione, sciacquare la bocca con acqua pulita.

Se necessario, la procedura può essere ripetuta dopo circa 7 giorni.

#### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in persone con ipersensibilità agli ingredienti del prodotto.

#### PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.

#### CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore a 25 °C.

Conservare lontano dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova sulla confezione diretta. Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

#### SMALTIMENTO DEL CONTENITORE

Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o restituite al produttore.

#### CONFEZIONI DISPONIBILI

Siringa contenente 2 ml di prodotto, applicatori monouso. Flacone contenente 50 ml di prodotto, adattatore con tappo a vite, dispenser, applicatori monouso.



Lichid pentru pungi gingivale

**ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SA CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTA INSTRUCȚIUNE**  
PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR

**COMPOZITIE:** apă, alcool etilic, digluconat de clorhexidina, peroxid de hidrogen

#### UTILIZARE

Produsul GLUCOSITE este destinat pentru utilizarea în timpul procedurilor stomatologice efectuate de către medic, pentru spălarea pungilor parodontale și alte zonele greu accesibile ale mucoasei orale, în scopul spălării și curățării acestora.

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de efectuarea intervenției aplicatorul trebuie înmuiat în spirt (alcool etilic), iar apoi plasat pe seringă. Cu ajutorul aplicatorului atașat, aplicați lichid, după care introduceți în punga gingivală în punga gingivală, deplasarea aplicatorului dea lungul liniei gingivale. După aplicare clățiți gura cu apă curată.

Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat după aproximativ 7 zile.

#### CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează la pacienții cu hipersensibilitate la componentele preparatului.

#### MĂSURI DE PRECAUȚIE

În caz de contact accidental cu ochii, clățiți imediat cu cantități mari de apă și consultați un medic.

În cazul ingestiei accidentale adresați-vă unui medic.

#### DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25° C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor Data de expirare este plasată pe recipientul principal. Odată ce recipientul este deschis, data de expirare nu se schimbă în cazul în care acesta este închis bine după fiecare utilizare

#### MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI

Ambalajele uzate trebuie transmise pentru reciclare sau returnate producătorului.

#### AMBALAJUL

O seringă conținând 2 ml de produs, aplicator de unică folosință. O folie conține 50 ml de produs, adaptor cu capac, dozator, aplicator de unică folosință.



Folyadék inyasakok kezeléséhez

**HASZNÁLAT ELŐTT OVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT**  
KIZÁRÓLAG FOGÁSZATI CÉLŰ FELHASZNÁLÁSRA

**ÖSSZETÉTEL:** víz, etilalkohol, klórhexidin-diglükonát, hidrogén-peroxid

#### JAVALLATOK

A GLUCOSITE fogorvos által végzett fogászati kezelések során az inyasakok és a szájüreg nyálkahártyájának más, nehezen hozzáférhető területeinek átmosására és megtisztítására szolgál.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A kezelés előtt merítse etil-alkoholba az adagolóhegyet, majd tegye fel a fecskendőre. A mellékelt applikátor segítségével a folyadékot a foginyasakba az applikátornak a foginyasak vonala mentén történő mozgatásával lehet bejuttatni. A kezelés befejezése után a szájüreget tiszta vízzel ki kell öblíteni.

Szükség esetén a kezelést 7 nap után meg lehet ismételni.

#### ELLENJAVALLATOK

Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely összetevőjére!

#### ÓVINTÉZKEDÉSEK

Szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal öblítse le és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén forduljon szakorvoshoz!

#### TÁROLÁS

Eredeti kiserelésében 25° C alatti hőmérsékleten tárolható. Gyermekektől távol tartandó! A termék lejáratí ideje a közvetlen csomagoláson olvasható. Felbontás után a termék lejáratí ideje nem változik, ha minden használat után légmentesen visszazárja.

#### AZ ELHASZNÁLT TERMÉK LESELEJTEZÉSE

Az elhasznált terméket, illetve a csomagolóanyagot juttassa vissza a gyártóhoz, vagy selejtezze le a helyi hatóságok előírásának megfelelően.

#### KISZERELÉS

2 ml készítményt tartalmazó injekciós tű, egyszer használatos applikátorok. 50 ml-es palack, adagoló fecskendő, kupakos adapter.



Течност за венечни джобове

**ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ**  
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТОМАТОЛОГ

**СЪСТАВ:** вода, етилов алкохол, хлорхексидин диглюконат, водороден пероксид

#### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ГЛЮКОЗИТ е предназначен за употреба при стоматологични интервенции, провеждани от зъболекар, за изплакване на венечните джобове и други, трудно достъпни места в устната лигавица с цел измиване и почистване.

#### НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди пристъпване към процедурата потопете добавения аппликатор в спирт (етилов алкохол), след това го поставете на спринцовката.

С помощта на приложениа аппликатор течността се полага върху венечния джоб, като препаратът се нанася с апликатора по дължината на венеца. След завършване на нанасянето устната кухина се изплаква с чиста вода.

В случай на нужда процедурата може да се повтори след ок. 7 дни.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се ползва при пациенти, алергични към съставките на препарата.

#### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

В случай на контакт с очите веднага изплакнете с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.

В случай на поглъщане потърсете медицинска помощ.

#### СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в плътно затворена опаковка при температура до 25° C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Срокът на годност е посочен на опаковката.

След отваряне на опаковката срокът на годност не се променя, ако след всяка употреба тя се затваря плътно.

#### ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА

Празните опаковки да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

#### ОПАКОВКА

Спринцовката съдържа 2 мл продукт, еднократни апликатори.. Бутилката съдържа 50 мл продукт, адаптер с капачка, диспенсър, еднократни апликатори.



Dantenų kišenių skystis

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA**  
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJŲ STOMATOLOGŲ NAUDOJIMUI

**SUDĖTIS:** vanduo, etilo alkoholis, chlorheksidino digliukonatas, vandenilio peroksidas

#### PAKIRTIS

GLUCOSITE skirtas naudoti stomatologinių procedūrų metu, dantenų kišenėms bei kitoms sunkiai prieinamoms burnos gleivinės vietoms skalauti.

#### NAUDOJIMO BŪDAS

Prieš pradėdant procedūrą aplikatorių pamerkti spirite (etilo alkoholis), po to patalpinti švirkšte. Aplikatoriaus pagalba išpausti skystis dantenų kišenėje, produktą paskirstyti kišenėje išilgai dantenų linijos. Pabaigus naudojimą praskalauti burnos ertmę švariu vandeniu.

Esant reikalui procedūrą pakartoti po 7 dienų.

#### KONTRAINDIKACIJOS

Negalima skirti pacientams jaučiamiems preparato sudedamosioms dalims.

#### ATSARGUMO PRIEMONĖS

Jeigu preparatas pateko į akį, tučiuojau kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Prarijus - kreipitis į gydytoją.

#### SAUGOJIMAS

Laikyti originalioje pakuotėje ne žemesnėje nei 25°C temperatūroje Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Galiojimo terminas nurodytas ant pirminės pakuotės. Atidarius pakuotę galiojimo terminas nesikeičia, jei po kiekvieno naudojimo pakuotė sandariai uždarama.

#### PRODUKTO PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Panaudotas pakuotes utilizuoti arba grąžinti gamintojui.

#### PAKUOTĖS

Švirkštas, kuriame yra 2 ml preparato, vienkartiniai aplikatoriai. Buteliukas, kuriame yra 50 g preparato, adapteris su užsukamu dangteliu, dozatorius, vienkartiniai aplikatoriai

